

脳卒中を予防する大切なお薬を飲み忘れないよう、 お薬を飲むたびに、毎回○(マル)印をつけましょう。

- プラザキサカプセル 75mg は1回2カプセルを1日2回飲むお薬です
- プラザキサカプセル 110mg は1回1カプセルを1日2回飲むお薬です

	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
朝	○	○	○	○	○	○	○
夕	○	○	○	○	○	○	○

	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
朝	○	○	○	○	○	○	○
夕	○	○	○	○	○	○	○

	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
朝	○	○	○	○	○	○	○
夕	○	○	○	○	○	○	○

	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
朝	○	○	○	○	○	○	○
夕	○	○	○	○	○	○	○

以下のような症状などがあらわれた場合には、**すぐに主治医に相談してください**

- 鼻や歯ぐきなどから出血が続く
- あざ(内出血)ができた
- 胸やけ・はきけ・むかつき
- 血尿や血便(赤色・黒色便)がでた
- 転倒した、体(特に頭)をぶつけた

血が止まらなくなった場合の対応

血が止まるまで、通常より時間がかかります。
 出血部位を手指でしっかりとおさえ続けてください。
 血が止まっても止まらなくても、主治医に相談してください。
 プラザキサには特異的中和剤がありますので、
 必ずプラザキサ服用中であることを医師に伝えてください。