



# プラザキサ<sup>®</sup> カプセル75mg・110mg 服薬指導のポイント

プラザキサ<sup>®</sup>の服薬指導として、下記のポイントを患者さんへお伝えください。




## プラザキサ<sup>®</sup>服用中の出血に、十分ご注意ください。

- 下記のような症状などがあらわれた場合には、**すぐに主治医に相談**するようご指導をお願い致します。
  - ▶ 鼻や歯ぐきなどから**出血**が続く
  - ▶ あざ（内出血）ができた
  - ▶ 胸やけ・はきけ・むかつき
  - ▶ **血尿**や**血便**（赤色・黒色便）がでた
  - ▶ 転倒した、体（特に頭）をぶつけた
- 血が止まらなくなった場合の対応についてご指導をお願い致します。
  - ▶ 血が止まるまで、通常より時間がかかります。出血部位を手指でしっかりとおさえ続けてください。
  - ▶ 血が止まっても止まらなくても、主治医に相談するよう指導してください。
  - ▶ プラザキサには特異的中和剤がありますので、必ずプラザキサ服用中であることを医師に伝えるよう指導してください。



## 服薬指導の際に、患者さんへ必ず伝えてください。

- プラザキサ<sup>®</sup>は**1日2回**服用するカプセル剤です。  
必ず主治医が指示した方法に従って服用するようご指導をお願い致します。
- プラザキサ<sup>®</sup>の服用にあたり、下記の点のご指導をお願い致します。
  - ▶ PTPシートから必ず服用する**直前**にとりだして**カプセルのまま**服用する
  - ▶ **食事中**または**コップ一杯分**の水で**飲みほす**
  - ▶ **誤って多く服用した場合は**、すぐに主治医または薬剤師に相談する
- 患者さんが自分の判断で本剤の**服用を中止したり、薬の量や回数を変更したりしない**ようご指導をお願い致します。
- 本剤を服用し忘れた場合、下記の通りご指導をお願い致します。
  - ▶ 服用し忘れた場合



● プラザキサ<sup>®</sup>製品添付文書より抜粋

【使用上の注意】

2.重要な基本的注意

(15) 患者の判断で本剤の服用を中止することのないよう十分な服薬指導をすること。本剤を服用し忘れた場合、同日中にできるだけ早く1回量を服用するとともに次の服用まで6時間以上空けさせること。服用し忘れた場合でも決して2回量を服用しないよう指導すること。



## プラザキサ<sup>®</sup>服用中に下記のようなときは、 必ず事前に主治医に相談するようご指導をお願い致します。

- ▶ 手術・内視鏡検査・抜歯の予定があるとき
- ▶ 新たに他の薬を服用したり、  
これまで服用していた他の薬を中止するとき
- ▶ 別の医療機関にかかるとき



# プラザキサ<sup>®</sup> カプセル75mg・110mg 調剤に関するお願い

プラザキサ<sup>®</sup>を調剤される際には、下記の点にご注意ください。

## ！ プラザキサ<sup>®</sup>は、吸湿性の高いお薬です。

- カートンからとり出した際は、**アルミピロー包装<sup>※</sup>のまま保管**をお願い致します。
- 調剤の際には、できるだけ**アルミピロー包装<sup>※</sup>のまま調剤し**、また、一化包を避けていただくようお願い致します。
- 本剤はPTPシートから必ず服用する**直前**にとり出して**カプセルのまま**服用するよう患者さんにご指導ください。



※ 1アルミピロー包装中に28カプセル (14カプセル入りPTPシート×2) を含む。

**プラザキサ**  
**75mg**  
28カプセル  
(14カプセル×2)

本剤は吸湿性があるので、できるだけこの袋のまま保管して下さい。また、カプセルは服用直前にシートから取り出して下さい。



75mgカプセルの場合

**プラザキサ**  
**110mg**  
28カプセル  
(14カプセル×2)

本剤は吸湿性があるので、できるだけこの袋のまま保管して下さい。また、カプセルは服用直前にシートから取り出して下さい。



110mgカプセルの場合

### ● プラザキサ<sup>®</sup> 製品添付文書より抜粋

#### 【使用上の注意】

#### 9. 適用上の注意

##### 薬剤交付時

- (2) 本剤は吸湿性があるので、服用直前にPTPシートから取り出すよう指導すること。また、アルミピロー包装<sup>※</sup>のまま調剤を行うことが望ましい。

注) 1アルミピロー包装中に28カプセル(14カプセル入りPTPシート×2)を含む。

##### 服用時

- (1) カプセルを開けて服用しないこと。  
(2) 速やかに胃に到達させるため、十分量(コップ1杯程度)の水とともに服用すること。

## ！ プラザキサ<sup>®</sup>は、1日2回服用するカプセル剤です。

### 1回150mg1日2回の場合

75mgカプセル 1回2カプセルを  
1日2回投与します。



### 1回110mg1日2回の場合

110mgカプセル 1回1カプセルを  
1日2回投与します。



### ● プラザキサ<sup>®</sup> 製品添付文書より抜粋

#### 【用法・用量】

通常、成人にはダビガトランエテキシラートとして1回150mg(75mgカプセルを2カプセル)を1日2回経口投与する。なお、必要に応じて、ダビガトランエテキシラートとして1回110mg(110mgカプセルを1カプセル)を1日2回投与へ減量すること。

#### (用法・用量に関連する使用上の注意)

- (1) 以下の患者では、ダビガトランの血中濃度が上昇するおそれがあるため、本剤1回110mg1日2回投与を考慮し、慎重に投与すること。  
・中等度の腎障害(クレアチニンクリアランス30-50mL/min)のある患者  
・P-糖蛋白阻害剤(経口剤)を併用している患者  
【「慎重投与」、「重要な基本的注意」、「相互作用」の項参照】
- (2) 以下のような出血の危険性が高いと判断される患者では、本剤1回110mg1日2回投与を考慮し、慎重に投与すること。  
・70歳以上の患者  
・消化管出血の既往を有する患者  
【「慎重投与」、「重要な基本的注意」の項参照】

日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

〒141-6017 東京都品川区大崎2丁目1番1号 ThinkPark Tower  
資料請求先：DIセンター  
0120-189-779 (受付時間 9:00~18:00 土・日・祝日・弊社休業日を除く)