


# ジオトリフを 服用される方へのお知らせ

## ジオトリフは1日1回、 毎日同じ時間の空腹時に服用

- ジオトリフは、1日1回、毎日同じ時間の**空腹時（食前の1時間以内、食後の3時間以内を避けて）**に、コップ1杯の水やぬるま湯で服用してください。



## ●飲み忘れた場合など



前回の服用時間を覚えていないなど、わからないことがある場合には、すぐに担当医、看護師、もしくは薬剤師に連絡してください。  
間違っただけ飲んだとき、多く飲みすぎてしまったかもしれないときにも連絡してください。

- ①服用時間に近い場合（8時間以内）は、服用せずに、次の決められた時間に定められた用量を服用してください。
- ②次の服用時間まで8時間以上ある場合、空腹時の条件（前の食事から3時間以上経過し、次の食事まで1時間以上時間があること）を満たすことができれば、服用することができます。

## ●薬剤保管上の注意

本剤は湿気と光に不安定なため、服用直前に開封し、開封後には湿気と光を避けて保存してください。

注意すべき症状は  
裏面参照▶

# このような症状に注意しましょう!

- 次のような症状がみられたら、すぐに担当医に連絡しましょう!

間質性肺疾患	<ul style="list-style-type: none"><li>・階段をのぼったり、少し無理をしたりすると息切れがする、息苦しくなる</li><li>・空咳(からせき)がでる</li><li>・発熱がある</li></ul>
下痢	<ul style="list-style-type: none"><li>・激しい下痢がある</li><li>・頻回の下痢を認める</li></ul>
皮膚症状	<ul style="list-style-type: none"><li>・高熱(38℃以上)</li><li>・皮膚の広い範囲が赤くなる</li><li>・目の充血、めやに(眼分泌物)、まぶたの腫れ、目が開けづらい</li></ul>
肝障害	<ul style="list-style-type: none"><li>・倦怠感</li><li>・尿の色が濃くなる</li><li>・皮膚や白目が黄色くなる</li></ul>
心障害	<ul style="list-style-type: none"><li>・呼吸困難や動悸があらわれる</li><li>・疲れを感じる</li><li>・足のむくみがあらわれる</li></ul>
消化管潰瘍、 消化管出血	<ul style="list-style-type: none"><li>・胃がもたれ、胸やけ、吐き気、食欲不振がある</li><li>・胃の痛み、空腹時あるいは食後にみぞおちに痛みがある</li><li>・吐血や便が黒くなる</li></ul>
眼の異常	<ul style="list-style-type: none"><li>・眼の痛み、腫れ、発赤</li><li>・ジオトリフ服用中のかすみ目や視覚の変化</li></ul>

施設名