

脳卒中を予防する大切なお薬を飲み忘れないよう、 お薬を飲むたびに、毎回○(マル)印をつけましょう。

- プラザキサカプセル 75mg は1回2カプセルを1日2回飲むお薬です
- プラザキサカプセル 110mg は1回1カプセルを1日2回飲むお薬です

	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
朝	○	○	○	○	○	○	○
夕	○	○	○	○	○	○	○

	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
朝	○	○	○	○	○	○	○
夕	○	○	○	○	○	○	○

	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
朝	○	○	○	○	○	○	○
夕	○	○	○	○	○	○	○

	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
朝	○	○	○	○	○	○	○
夕	○	○	○	○	○	○	○

以下のような症状などがあらわれた場合には、**すぐに主治医に相談してください**

- 鼻や歯ぐきなどから出血が続く
- あざ(内出血)ができた
- 胸やけ・はきけ・むかつき
- 血尿や血便(赤色・黒色便)がでた
- 転倒した、体(特に頭)をぶつけた


血が止まらなくなった場合の対応

血が止まるまで、通常より時間がかかります。
出血部位を手指でしっかりとおさえ続けてください。
血が止まっても止まらなくても、主治医に相談してください。
プラザキサには特異的の中和剤がありますので、
必ずプラザキサ服用中であることを医師に伝えてください。

裏面もご覧ください

プラザキサの上手な飲み方

- プラザキサは
1日2回
きちんと
飲みましょう



- 食事中に飲みましょう。
またはコップ1杯の水で飲みましょう。

1
水をコップ
1杯分用意
します。

A glass of water is shown next to a plate of food, including a bowl of miso soup, a bowl of rice, and a plate of vegetables and meat.

2
PTPシートから
とりだした
カプセルと、
水を口に
含みます。

An elderly man in a green cardigan is shown holding a capsule in his hand and a glass of water.

3
あごを引いて*、
水と一緒に
飲み込みます。

An elderly man in a green cardigan is shown drinking from a glass. An inset shows a hand holding a capsule in a glass of water.

4
残りの水を
飲んで、
胃の中に
しっかり
入れましょう。

An elderly man in a green cardigan is shown drinking from a glass. An inset shows a cross-section of a stomach with a capsule floating in water.

※プラザキサカプセルは水に浮きます。

あごを引くと、口の中の水に浮いた状態になり、水と一緒に飲みやすくなります。

日本ベリンガーインゲルハイム株式会社

〒141-6017 東京都品川区大崎2丁目1番1号 ThinkPark Tower
資料請求先：DIセンター

0120-189-779 (受付時間 9:00~18:00 土・日・祝日・弊社休業日を除く)

